

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ

Тихоновская И.В.

За период с февраля 1998 по ноябрь 2003 год в клинике кожных и венерических болезней Витебского государственного медицинского университета на базе Витебского кожно – венерологического диспансера наблюдалось 85 больных гнездной алопецией (ГА). Средний возраст пациентов - $26,9 \pm 8,85$ лет. Локальная (очаговая) форма наблюдалась у 56 пациентов (65,8% от общего числа больных) и характеризовалась изолированными очагами выпавших волос, округлой формы с практически неизменной кожей на месте поражения. Субтотальная форма наблюдалась у 23 больных (27,06%) и характеризовалась обширными очагами поражения, образовавшимися в результате слияния мелких очагов с площадью поражения волосистой части головы более 50%. С тотальной формой гнездной алопеции, которая характеризовалась выпадением волос на волосистой части головы, бровях, ресницах, у мужчин волос бороды наблюдалось 2 пациента (2,35 %). С универсальной гнездной алопецией наблюдалось 4 пациента (4,71%).

Для этой формы характерна потеря волос на всей поверхности тела (голова, туловище, конечности). В результате проведенных исследований нами была выделена в отдельную форму гнездная алопеция с поражением ногтей. У 18 (21, 1%) из обследованных пациентов обнаружены явления ониходистрофии. При анализе клинических проявлений ГА выделялись следующие типы этого заболевания: обычный, регипертензивный, смешанный, аутоиммунный, подростковый. С обычным типом гнездной алопеции было 53 пациента (62,3%), из них мужчин - 27 (50,9 %), женщин – 26 (49, 1%). Наблюдалась одна пациентка (1,2%) с четко установленным регипертензивным типом гнездной алопеции. Атопический тип гнездной алопеции был установлен у 7 пациентов (8,3%). Были зафиксированы два случая (2,3%) сочетания псориаза и ГА, что позволило установить аутоиммунный тип заболевания. Смешанный тип мы наблюдали у 8 больных, что составило 9,4%. Неустановленный тип, неуточненный (подростковый) – установлен нами впервые и наблюдался у 14 (16, 4 %) пациентов.

Выводы: 1) гнездная алопеция характеризуется разнообразными клиническими проявлениями; 2) выделение нового типа гнездной алопеции позволит в дальнейшем более детально изучить особенности патогенеза этого заболевания у подростков и разработать эффективные и безопасные для этой категории пациентов методы лечения.